

Vaxigrip

Vaxigrip Junior

Influenza vaccine

Vaccinum **ATC: J 07 BB**

Sanofi Pasteur

zawiesina do wstrz. dom. lub podsk.: 1 amp.- strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP
zawiesina do wstrz. dom. lub podsk.: 1 strzyk. 0,25 ml	(Rp)	PP

Skład

Vaxigrip: 1 dawka 0,5 ml zawiera rozszczepione, inaktywowane wirusy grypy zawierające antygeny odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg, A (H3N2) - 15 µg oraz B - 15 µg. Vaxigrip Junior: 1 dawka 0,25 ml zawiera rozszczepione, inaktywowane wirusy grypy zawierające antygeny odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 7,5 µg, A (H3N2) - 7,5 µg oraz B - 7,5 µg. Skład szczepionki jest aktualizowany corocznie w zależności od danych epidemiologicznych, zgodnie z zaleceniami WHO.

Działanie

Szczepionka przeciw grypie zawierająca inaktywowane, rozszczepione wirusy. Odporność pojawia się po 2-3 tygodniach. Odporność wobec szczepów analogicznych do zawartych w szczepionce lub wobec szczepów pokrewnych utrzymuje się przez 6-12 mies.

Wskazania

Profilaktyka grypy, szczególnie u osób narażonych na powikłania pogrypowe. Szczepionka Vaxigrip Junior przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-35 m.ż., przede wszystkim dla tych, które są narażone na powikłania pogrypowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, jaja lub białko kurze, formaldehyd, neomycynę i octoxytol-9. Preparatu nie wolno stosować donaczyniowo.

Środki ostrożności

W przypadku ostrej infekcji lub gorączki szczepienie należy odłożyć.

Ciąża i okres karmienia piersią

Stosowanie szczepionki może być rozważane od II trymestru ciąży, jednak w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych zaleca się szczepienie niezależnie od okresu ciąży. Karmienie piersią nie stanowi

przeciwwskazania do szczepienia.

Działanie niepożądane

Mogą wystąpić: zaczerwienienie, obrzęk, ból, siniak lub stwardnienie w miejscu podania; gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia, ból głowy, mięśni i stawów, nadmierne pocenie - objawy te zazwyczaj ustępują samoistnie po 1-2 dniach. Niezbyt często: świąd, pokrzywka, niespecyficzna wysypka. Rzadko: nerwoból, parestezje, drgawki, przejściowa trombocytopenia, reakcje nadwrażliwości rzadko prowadzące do wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, zapalenie naczyń z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek, zaburzenia neurologiczne (zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu, zespół Guillain-Barré).

Interakcje

W przypadku równoczesnego podawania z lekami immunosupresyjnymi lub w przypadku niedoborów odporności odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być zmniejszona. Przy jednoczesnym stosowaniu z innymi szczepionkami należy je podawać w różne miejsca ciała.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnio. Vaxigrip: dorośli i dzieci od 36 m.ż.: 0,5 ml/dawkę jednorazowo. Dzieciom do 8 r.ż., które nie były szczepione przeciw grypie należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni. Vaxigrip Junior: dzieci 6 m.ż.- 35 m.ż.: 0,25 ml/dawkę. Dzieciom, które nie były szczepione przeciw grypie należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni.